

## Indicaties voor antiretrovirale therapie

### Behandeling van HIV.

De behandeling van patiënten begint bij een aangetoonde HIV infectie + aantal CD4 cellen  $>350/\text{mm}^3$ .

De behandeling bestaat initieel uit:

zidovudine + lamivudine + nevirapine.

Indien naast een aangetoonde HIV infectie, tevens de diagnose *chronisch actieve hepatitis B* of *Kaposi sarcoom* gesteld is, begint de behandeling *ongeacht het aantal CD4 cellen*.

De behandeling duurt levenslang. Therapietrouw is essentieel.

De BEG aanvraag ( zie hieronder) is daarom eenmalig.

Bij noodzaak tot wijziging van de medicatie is een nieuwe aanvraag vereist.

### Prevention Mother to Child Transmission (PMTCT).

Deze therapie vindt plaats bij een aangetoonde HIV infectie van de moeder tijdens de zwangerschap en duurt tot max. 2 weken erna.

**PMTCT** voor een pasgeborene van een met HIV besmette moeder, begint direct na de geboorte tot de leeftijd van 4 weken.

**Post Exposure Prophylaxis (PEP)**, voor gezondheidswerkers, is nodig na mogelijke besmetting met HIV.

Duur: max. 4 weken.

**Post Exposure Prophylaxis (PEP)** is nodig voor HIV neg. personen die door seksueel misbruik met HIV in contact kwamen. Duur: max. 4 weken.

**Tweedelijnsbehandeling** is geïndiceerd als door resistentie tegen HIV, de therapie faalt.

April 2013

De NGK commissie