

Indicaties en dosering van fluconazol cap. 200mg

- Behandeling van **meningitis** door **cryptococcen** veroorzaakt:

fluconazol (800mg gedurende 2 weken, samen met amfotericine B) *gevolgd door*

fluconazol monotherapie (400mg, kinderen 6mg/kg per dag, gedurende 8 weken) *gevolgd door*

fluconazol monotherapie (200mg, kinderen 6mg/kg tot max. 200mg, per dag) totdat CD4 cellen gedurende > 3 maanden meer dan 200 cellen/mm³ zijn.

- Behandeling van **extra-meningeale cryptococcen** infectie

Milde infecties: fluconazol 400mg, kinderen 6mg/kg, per dag, gedurende 2 weken.

Ernstige infecties: fluconazol gecombineerd met amfotericine B.

- Behandeling van **gelokaliseerde** infecties met **Candida**, bij **HIV pos.** individuen (m.u.v. milde orofaryngeale infecties, waarvoor lokale therapie voldoet), indien **ketoconazol ongeschikt** is:

- *indien nevirapine of een proteaseremmer gebruikt wordt of binnenkort zal worden gebruikt.*
- *tijdens een acute of chronische leverziekte.*
- *indien een ketoconazol resistente candida infectie bestaat.*
- *bij bekende intolerantie voor ketoconazol.*

Dosering fluconazol 400mg oplaaddosis, gevolgd door 200mg per dag, gedurende 2 weken.